

Questo riassunto informale è stato creato con ChatGPT (versione GPT-4o), approvato dal responsabile del progetto e tradotto con Deepl.com.

Spondiloartrite assiale precoce secondo la definizione di consenso ASAS: caratterizzazione dei pazienti ed efficacia di un primo inibitore del TNF in un ampio registro osservazionale

Lo studio analizza lo stadio precoce della malattia nei pazienti con spondiloartrite assiale (axSpA) e dolore alla schiena di durata inferiore a 2 anni, secondo la definizione di consenso recentemente pubblicata dalla Assessment of SpondyloArthritis International Society (ASAS). Nella coorte Swiss Clinical Quality Management (SCQM), il 20% dei pazienti è stato reclutato in questa fase iniziale della malattia.

Mentre l'attività della malattia, la compromissione funzionale e la qualità della vita erano paragonabili nella malattia precoce rispetto a quella conclamata, la mobilità spinale compromessa e il danno radiografico erano più frequenti nei pazienti con una durata di malattia più lunga. Per verificare se esiste una finestra di opportunità se i pazienti vengono trattati più precocemente con i biologici, è stata confrontata la risposta a un primo inibitore del fattore di necrosi tumorale (TNFi) nei pazienti con axSpA precoce rispetto a quelli con axSpA conclamata. Non sono state rilevate differenze significative nella ritenzione del farmaco e nei tassi di risposta tra i due gruppi, dopo aver tenuto conto dei potenziali fattori confondenti. Resta da stabilire se sia possibile ottenere una migliore risposta al trattamento se i pazienti vengono diagnosticati e trattati in una fase ancora più precoce (entro un anno dall'inizio del dolore alla schiena).

Link alla pubblicazione: Early axial spondyloarthritis according to the ASAS consensus definition: characterisation of patients and effectiveness of a first TNF inhibitor in a large observational registry at <https://rmdopen.bmj.com/content/9/4/e003455>